

Tài liệu tuyên truyền
phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
(Kèm theo Công văn số 2021 - CV/BTGTU, ngày 10/6/2019
của Ban Tuyên Giáo Tỉnh uỷ)

I. Tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi:

1. Tính đến ngày 07/6/2019 bệnh dịch tả lợn châu Phi (viết tắt: DTLCP) đã xảy ra tại 3.793 xã, 375 huyện của 55 tỉnh, thành phố, với tổng số lợn bệnh và tiêu huỷ là hơn 2.336.160 con; Bình Thuận, là tỉnh thứ 55 trong cả nước công bố dịch tả lợn châu Phi, ổ dịch ghi nhận đầu tiên xuất hiện tại thôn 1, xã Gia An, huyện Tánh Linh; ổ dịch thứ hai được xác định tại thôn 1, xã Đức Chính, huyện Đức Linh (tổng số lợn chết và tiêu huỷ là 37 con). Theo quy định tại Quyết định số 4527/QĐ-BNN-TY, ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh DTLCP, thời gian qua đã có 139 xã thuộc 24 tỉnh, thành phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, không phát sinh lợn bệnh; có 48 xã thuộc 15 tỉnh phố có dịch bệnh đã qua 30 ngày, nhưng sau đó lại phát sinh lợn bệnh.

2. Đến nay, 68 trang trại chăn nuôi tập trung, 241 cơ sở giết mổ, 7.747 hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ trong toàn tỉnh đã được các cấp chính quyền, cán bộ của các trạm thú y triển khai, quán triệt các biện pháp phòng, chống Bệnh DTLCP.

3. Bệnh DTLCP có chiều hướng lây lan do các nguyên nhân sau:

- Do một số người chăn nuôi, thương lái chưa nhận thức đầy đủ được tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, cũng như vì lợi ích kinh tế trước mắt nên khi có lợn bệnh, lợn chết đã mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn nghi mắc bệnh, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh ở phạm vi rộng.

- Vi rút DTLCP có khả năng tồn tại lâu trong lợn bệnh, các sản phẩm lợn bệnh, trong môi trường và dụng cụ chăn nuôi; trong khi đó, phần lớn hiện nay vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ, mật độ chăn nuôi cao, các hộ chăn nuôi đan xen trong các khu dân cư và các hộ chăn nuôi này khó hoặc không thường xuyên thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh phòng bệnh; tình trạng sử dụng thực phẩm dư thừa trong chăn nuôi khá phổ biến, dẫn đến dịch bệnh lây lan nhanh.

- Thời tiết tại biến đổi bất lợi, mưa âm kéo dài, nắng nóng gay gắt, tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát triển, lây lan; trong khi hiện nay chưa có vắc-xin và thuốc điều trị nên bệnh DTLCP diễn biến phức tạp, khó lường.

- Vi rút DTLCP có thể lây lan từ khu vực có dịch sang nơi khác qua phương tiện vận chuyển, con người...

II. Trước tình hình bệnh DTLCP, chúng ta cần tuân thủ nghiêm quy định trong hoạt động chăn nuôi và phòng chống dịch

1. Thực hiện nguyên tắc “05 không”

- 1.1. Không giầu dịch;
- 1.2. Không mua bán vận chuyển lợn bệnh, lợn chết;
- 1.3. Không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh cũng như thịt lợn chết;
- 1.4. Không vứt xác lợn bệnh, chết ra môi trường để làm phát tán dịch bệnh rộng hơn;
- 1.5. Không sử dụng thức ăn thừa để nuôi lợn mà không qua xử lý nhiệt.

2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch:

2.1. Thường xuyên dọn dẹp, rửa sạch, sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, khu vực xung quanh trại.

2.2. Hạn chế khách tham quan, hạn chế cho thương lái vào khu vực chăn nuôi. Trong trường hợp phải đi vào chuồng nuôi phải thay trang phục và mang ủng hoặc giày dép của trại, đồng thời thực hiện tiêu độc khử trùng cho người, dụng cụ và phương tiện.

2.3. Tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng, cung cấp thức ăn có đầy đủ các chất dinh dưỡng (như: vitamin ADE, C, B- Complex và Remix kháng) để tăng sức đề kháng cho đàn lợn. Thực hiện vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng trại ít nhất 1 lần/tuần bằng thuốc sát trùng Iodine, benkocid,...

2.4. Khi nhập lợn về nuôi và khi xuất bán lợn khai báo với cơ quan thú y để kiểm dịch. Có biện pháp diệt côn trùng, chuột, không cho chó, mèo, gà, vịt và các loại gia súc, gia cầm khác vào trong trại chăn nuôi.

2.5. Khi phát hiện đàn lợn có những biểu hiện của bệnh truyền nhiễm như sốt cao, bỏ ăn hàng loạt,... hoặc lợn có các triệu chứng điển hình của bệnh dịch tả lợn châu Phi phải báo ngay cho Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị, thành phố, cán bộ thú y hoặc chính quyền xã, phường, thị trấn để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

3. Khi xác định có dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại hộ gia đình, trại nuôi:

3.1. Cần phát hiện nhanh lợn bị bệnh, báo cáo kịp thời cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương (xã, phường, thị trấn).

3.2. Không đưa lợn, sản phẩm thịt lợn ra khỏi trại nuôi.

3.3. Tiêu huỷ lợn chết, lợn mắc bệnh và tất cả lợn khỏe trong đàn có dịch bệnh. Tuyệt đối không bán chạy, bán tháo, không giết mổ lợn bệnh, không vứt xác lợn chết bừa bãi và đem chôn theo đúng hướng dẫn của cơ quan thú y.

3.4. Thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại:

- Quét dọn thu gom, tiêu huỷ phân rác, chất thải chuồng trại...
- Rửa sạch dụng cụ chăn nuôi, chuồng trại, để khô sau đó dùng chất sát trùng như nước vôi 10-20%, xút 2-3%, formol 2-3%, crezin 5%,... Iodine tiêu độc. Thực hiện 3 lần/tuần.
- Nước rửa chuồng trại phải được xử lý trước khi đưa ra ngoài bằng cách cho vôi vào đạt nồng độ 10 %.
- Tất cả những người tiếp xúc với lợn phải mang bảo hộ lao động và sau khi làm việc xong trang bị cũng phải được tiêu huỷ.

3.5. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hướng dẫn của chính quyền địa phương và các cơ quan thú y để bảo vệ đàn lợn.

4. Trong công tác tuyên truyền cần lưu ý:

Tuyên truyền cho nhân dân hiểu về chính sách hỗ trợ của Nhà nước khi đàn lợn bị dịch bệnh (80%), ngăn chặn tình trạng bán tháo lợn bệnh;

Tuyên truyền để người tiêu dùng không quay lưng lại với thịt lợn, tạo điều kiện phát triển ngành chăn nuôi lợn.

Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và môi trường sinh thái.

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY